

## BOMBERO

Concentrado Emulsionable

### INGREDIENTE ACTIVO:

Clorpirifos + Permetrina

### REGISTRO:

RSCO-MEZC-1105-303-009-039

### RIQUEZAS GARANTIZADAS

#### CLORPIRFOS ETIL:

O,O-dietil O -3,5,6-tricloro-2-piridinil fosforotioato  
(Equivalente a 350 g. de i.a. /L a 20° C)



#### PERMETRINA:

3-fenoxibencil (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato (60% de isómero trans y 40% de isómero cis) (Equivalente a 50 g. de i.a./ L a 20° C)

Ingredientes Inertes - 61.40%

Disolventes, emulsificante

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	APLICACIÓN
Maíz, Sorgo, Avena, Cebada, Trigo (21)	Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)	0.75-1.0 L/ha	Se recomienda aplicar sobre las larvas en estadíos iniciales, cuando se tenga un 25% de planta dañada. Realizar dos aplicaciones al cogollo y al follaje a intervalo de 7 días. Con equipo de aplicación terrestre (motorizado o manual), utilice un volumen de 200 a 400 litros de agua por hectárea.
Cidro, Lima, Limonero, Mandarino, Naranja, Pomelo, Toronjo (34)	Araña roja (Tetranychus urticae)	1.0 – 2.0 mL/Lde agua	Inicie las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas de infestación o se detecten los primeros individuos. Calibre el equipo de aplicación para determinar el gasto por árbol. Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días. Utilice la dosis alta en infestaciones severas.

### DOSIS RECOMENDADA

0.75 a 1.0 litros por Ha. (para mayor información ver la etiqueta del producto).

### USOS

Aprobado por la Sagarpa para su uso en el cultivo de Maíz.

### PRECAUCIONES ESPECIALES

Nocivo si se inhala.



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola

innovacionagricola.com  
01 800 248 8800

