

## DIAZINON 25

Concentrado emulsionable

INGREDIENTE ACTIVO:

**Diazinon 25**

REGISTRO:

**RSCO-INAC-0120-374-009-025**

RIQUEZAS GARANTIZADAS

**Sal Isopropilamina De Glifosato:**

**0,0-dietil 0-(6-metil-2-(1-metil etil)-4-pirimidinil) fosforotioato No menos de 25.00% (Equivalente a 232 g de I.A./L)**



**Ingredientes Inertes - 75.00 %**

Solventes, emulsificantes y compuestos relacionados.

PARA EL CONTROL DE:

Trips, pulgón, chinche manchadora, chinche, chinche verde, chinche café, chicharritas, mosquita blanca, diabroticas, minador de la hoja, pulgón, pulga soltona, araña roja, chinche ligus, mosca pinta, pulgón amarillo, barrenador, picudo del ejote, pulgón del cogollo, pulgón del follaje, chapulines, escama de San José, frailecillo, chinche de encaje, escama algodonosa, escama roja de California, pulbón ianígero, chinche de los cereales, piojo harinoso, mosca midge, pulgón de follaje, trips negro.

PRINCIPALES CULTIVOS:

Algodonero, melón, sandía, pepino, apio, caña de azúcar, cebolla, chícharo, chile, frijol, jitomate, lechuga, maíz, alfalfa, cacahuate, fresa, durazno, ciruelo, higo, manzano, peral, pastos, piña, plátano, sorgo, soya, tabaco, trigo.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha
<b>Algodonero (14)*</b>	Trips (Frankliniella spp.) Pulgón (Aphis gossypii) Chinche manchadora (Dysdercus spp.) Chinche (Chlorochroa ligata) Chinche verde (Nezara viridula) Chinche café (Euschistus servus) Chicharritas (Eutettix tenellus) Mosquita blanca (Bemisia tabaco)	1.5 - 3.0
<b>Melón (3) Sandía (3) Pepino (7)</b>	Diabroticas (Diabrotica spp.) Minador de la hoja (Liriomyza spp.) Mosquita blanca (Trialeurodes sp.) Chicharritas (Empoasca sp.) Pulgón (Aphis gossypii) Pulga saltona (Epiditrix spp.)	1.0 - 1.5
<b>Apio (10)</b>	Araña roja (Tetranychus spp.) Chinche ligus (Lygus sp.)	1.0
<b>Caña de Azúcar (28)</b>	Mosca pinta (Aeneolamia postica) Pulgón amarillo (Sipha flava) Barrenador (Chilo loftini)	1.0 - 1.5
<b>Cebolla (10)</b>	Trips (Thrips tabaci) Minador de la hoja (Liriomyza sp.) Gusano de la cebolla (Hylemia antiqua) Chinche ligus (Lygus sp.)	1.0 - 1.5
<b>Chícharo (21)</b>	Pulgón verde (Acyrtosiphon pisum) Minador de la hoja (Liriomyza pusilla) Trips (Frankliniella sp.) Araña roja (Tetranychus sp.)	1.0 - 1.5
<b>Chile (10)</b>	Pulgones (excepto Myzus) (Aphis spp.) Pulga saltona (Epiditrix spp.) Mosquita blanca (Trialeurodes vaporariorum) Minador de la hoja (Liriomyza spp.)	1.0 - 1.5
<b>Frijol (7)</b>	Picudo del ejote (Apion godmani) Chicharritas (Empoasca spp.) Mosquita blanca (Trialeurodes vaporariorum) Diabroticas (Diabrotica spp.) Minador de la hoja (Liriomyza spp.) Trips (Caliothrips phaseoli)	1.0 - 1.5
<b>Jitomate (1)</b>	Minador de la hoja (Liriomyza munda) Mosquita blanca (Bemisia tabaci) Pulga saltona (Epiditrix sp.) Chinche pequeña (Cyrtopeltis notatus) Pulga negra (Halticus sp.) Pulgón (Macrosiphum solanifolii) Chicharrita (Eutettix tenellus) Trips (Frankliniella spp.)	1.0 - 1.5

<b>Lechuga (14)</b>	Pulgón (Brevicoryne brassicae, Aphis spp.) Trips (Frankliniella occidentalis)	1.0 - 1.5
<b>Maíz (5L)</b>	Araña roja (Oligonychus mexicanus) Pulgón del cogollo (Rhopalosiphum maidis) Pulgón del follaje (Schizaphis graminum) Chicharrita (Dalbulus maidis) Trips (Frankliniella occidentalis) Chapulines (Melanoplus spp.)	1.0 - 1.5
<b>Alfalfa (7)</b>	Pulgón manchado (Therioaphis maculata) Pulgón verde (Acyrtosiphon pisum) Chicharritas (Aceratagallia curvata) Trips (Frankliniella spp.)	1.0 - 1.5
<b>Cacahuete (21)</b>	Trips (Caliothrips phaseoli)	1.0
<b>Fresa (5)</b>	Araña roja (Tetranychus spp.) Pulgones (Pentatrichopus spp.) Mosquita blanca (Trialeurodes sp.) Trips (Thrips spp.)	4.0 - 5.0
<b>Durazno (20) Ciruelo (10)</b>	Escama de San José (Quadraspidiotus perniciosus) Frailecillo (Macroductylus spp.)	150 - 200 ml/ 100 L de agua
<b>Higo (10)</b>	Chinche de encaje (Corythucha spp.) Escama algodonosa (Icerya purchasi) Escama roja de california (Aonidiella aurantii)	150 ml / 100 L de agua
<b>Manzano (14) Peral (14)</b>	Pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum) Escama de San José (Quadraspidiotus perniciosus) Frailecillo (Macroductylus sp.) Pulgón verde (Aphis pomi) Trips (Frankliniella insularis)	100 - 150 ml/ 100 L de agua
<b>Pastos (21)</b>	Mosca pinta (Aeneolamia postica) Chinche de los cereales (Blissus leucopterus) Chicharrita (Dalbulus elimatus)	1.0 - 1.5
<b>Piña (30)</b>	Piojo harinoso (Dysmicoccus brevipes)	150 ml/100 L de agua
<b>Plátano (0)</b>	Trips (Frankliniella parvula)	150 ml/100 L de agua
<b>Sorgo (7)</b>	Mosca Midge (Contarinia sorghícola) Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) Pulgón del cogollo (Rhopalosiphum maidis) Pulgón del follaje (Schizaphis graminum) Barrenador del tallo (Diatraea sp.) Chapulines (Melanoplus sp.)	1.0 - 1.5
<b>Soya (7)</b>	Trips negro (Caliothrips phaseoli) Chinche verde (Nezara viridula) Chinche café (Euschistus servus) Chinche ligus (Lygus sp.) Chicharrita (Empoasca sp.)	1.0 - 1.5
<b>Tabaco (21)</b>	Mosquita blanca ( Bemisia tabaci) Pulga saltona (Epiditrix spp.)	1.5
<b>Trigo ( 7)</b>	Pulgón del cogollo (Rhopalosiphum maidis) Pulgón del follaje (Schizaphis graminum)	1.5

\*Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 900-1000 L de agua/ha.

\*\*Realizar dos aplicaciones, al follaje, a intervalos de 14 días; volumen de aplicación 600-700 L/ha.

\*\*\*Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación. LMR:**

<b>Alfalfa</b>	0.02 mg/Kg
<b>Algodonero</b>	0.02 mg/Kg
<b>Apio</b>	0.70 mg/Kg
<b>Cacahuete</b>	0.02 mg/Kg
<b>Caña De Azúcar</b>	0.01 mg/Kg
<b>Cebolla</b>	0.75 mg/Kg
<b>Chícharo</b>	0.01 mg/Kg
<b>Chile</b>	0.05 mg/Kg
<b>Ciruelo</b>	0.20 mg/Kg
<b>Durazno</b>	0.20 mg/Kg

Fresa	0.02 mg/Kg
Frijol	0.02 mg/Kg
Higo	0.70 mg/Kg
Jitomate	0.02 mg/Kg
Lechuga	0.01 mg/Kg
Maíz	0.75 mg/Kg
Manzano	0.01 mg/Kg
Melón	0.05 mg/Kg
Pastos	0.20 mg/Kg
Pepino	0.20 mg/Kg
Peral	0.50 mg/Kg
Piña	0.50 mg/Kg
Plátano	0.20 mg/Kg
Sandía	0.01 mg/Kg
Sorgo	0.01 mg/Kg
Soya	0.20 mg/Kg
Trigo	0.01 mg/Kg

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.**

Diluir la dosis recomendada en agua suficiente para proporcionar una cobertura uniforme.

**CONTRAINDICACIONES.** No aplique cuando el viento sea muy fuerte (>15 km/hr) ni en las horas de calor intenso (>35oC).

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendados.

**INCOMPATIBILIDAD.** No se recomienda DIAZINON 25 CE en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

