

UNROYA

Concentrado emulsionable

INGREDIENTE ACTIVO:

Tebuconazol

REGISTRO:

RSCO-FUNG-0349-X0104-009-23.80

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

Tebuconazol: (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C).

INGREDIENTES INERTES

Emulsificantes y disolvente

PARA EL CONTROL DE:

Roya (Puccinia sp.), Tizón temprano (Alternaria solani), Cenicilla de las cucurbitáceas (Erysiphe cichoracearum.)

PRINCIPALES CULTIVOS:

Avena, Cebada, Chile, Melón.



CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/Ha)	OBSERVACIONES
Avena (30)*	Roya (Puccinia sp.)	0.5 – 0.6	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 550 – 650 L de agua/ha.
Cebada (30)	Roya (Puccinia sp.)	0.5	
Chile (14)	Tizón temprano (Alternaria solani)	0.75 – 1.0	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalo de 7 días; volumen de aplicación 330 – 430 L de agua/ha.
Melón (14)	Cenicilla de las cucurbitáceas (Erysiphe cichoracearum.)	0.60 – 0.75	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 6 días; volumen de aplicación 400 – 500 L de agua /ha.

* () Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS

24 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto, abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare. Aplíquese en forma de aspersión usando cualquier tipo de equipo terrestre que asegure un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

CONTRAINDICACIONES

Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, realice las aplicaciones a favor del viento (no mayores a 15 km/hr). No aplicar ni manejar el producto sin el equipo de protección adecuado. No se aplique en cultivos diferentes a los autorizados en esta etiqueta. No aplique cuando las condiciones atmosféricas sean adversas, para evitar el lavado del producto.



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola

innovacionagricola.com
01 800 248 8800



FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a los cultivos recomendados, si es aplicado según las instrucciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

MANEJO DE RESISTENCIA

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola

innovacionagricola.com
01 800 248 8800

