

MEXTLI

Fungicida / Suspensión concentrada

INGREDIENTE ACTIVO:

Clorotalonil

REGISTRO:

RSCO-FUNG-0309-X0048-064-53.49

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Clorotalonil: Tetracloroisofalónitrilo

53.49% Equivalente a 719.5 g de I. A. por L



Ingredientes Inertes:

Diluyente (agua), estabilizante, dispersante, humectante, anticongelante y antiespumante.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Jitomate, Papa (SL)	Tizón Tardío (Phytophthora infestans)	2.5 - 3.0 (L/ha)	Se recomienda realizar 3 aspersiones al follaje a intervalos de siete días. Con un gasto de agua de 400 a 500 L/ha
Jitomate, Tomate de cáscara, papa, chile (SL)	Tizón Temprano (Alternaria solani)	2.5 - 3.5 (L/ha)	Se recomienda realizar 3 aspersiones al follaje a intervalos de siete días. Con un gasto de agua de 400 a 500 L/ha.

USOS:

En los cultivos de papa, jitomate, tomate de cáscara y chile para el control de Tizón Tardío y Tizón Temprano.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Puede provocar reacciones alérgicas temporales, irritación y enrojecimiento de las partes expuestas de la piel, irritación de los ojos. La intoxicación por la vía digestiva es rara, a menos que se ingieran grandes cantidades del producto de forma intencional.