

RAFIK

Concentrado emulsionable

INGREDIENTE ACTIVO:

Cletodime

REGISTRO:

REG. RSCO-HEDE-0270-310-009-013

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Cletodime:

 (5RS)-2-(E)-3-cloroaliloximino]propil}-5-[(2RS)-2-(etilitio)propil]-3-hidrox ciclohex-2-en-1-ona
 Equivalente a 120g de i.a./L a 20C

Ingredientes Inertes - 87 %

Estabilizante, emulsificantes y solvente.

PARA EL CONTROL DE:

Zacate Johnson, Avena loca, Alpiste.

PRINCIPALES CULTIVOS:

Alfalfa, Algodonero, Calabaza, Calabacita, Melón, Sandía, Pepino, Cebolla, Tomate de cáscara, Jitomate, Papa, Chile y Berenjena.

CULTIVO	DOSIS L/ha	MALEZAS	FORMA DE APLICACIÓN
Alfalfa (15)	0.60-0.80	ZACATE JOHNSON Sorghum halepense	Aplicar en post-emergencia a la maleza y al cultivo en aplicación total. Aplicar cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo, con una altura máxima entre 15-20 cm. y/o de 4 a 6 hojas como máximo.
Algodonero (60)	0.60-0.80		
Calabaza Calabacita Melón Sandía Pepino (14)	0.60-0.80		
Cebolla (45)	0.60-0.80	AVENA LOCA Avena fatua	
Tomate de cáscara (20) Jitomate Papa Chile Berenjena (30)	0.60-0.80	ALPISTE Phalaris mino	

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL = Sin Límite

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 48 Horas después de haber aplicado el producto.
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Forma de abrir el envase del producto: Forma de abrir el envase del producto: Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mézclese la dosis de RAFIK en la cantidad necesaria de agua para cubrir una hectárea. La cantidad de agua variará de acuerdo con la altura de la maleza. La superficie del suelo debe ser húmeda (lluvia o riego) para que el producto actúe adecuadamente, mezclar el producto con agua limpia y en cantidades suficientes para lograr buen cubrimiento. Se aplica de 150 a 250 L/ha de agua en mezcla con el producto, con los equipos convencionales de aspersión, usando una boquilla de abanico (Teejet 8002 y 8003). RAFIK se aplica en post-emergencia a la maleza y el cultivo, debe aplicarse cuando las malezas tengan como máximo 15-20 cm de altura.

CONTRAINDICACIONES. Por la actividad residual de RAFIK, el suelo tratado debe ser incorporado a una profundidad de 10cm antes de sembrar o plantar cualquier otro tipo de rotación. No aplicar el producto sin el equipo de protección adecuado.

FITOTOXICIDAD: no tiene efectos fitotóxicos aplicado exclusivamente en los

DE VENTA EN:



Innovación Agrícola

 innovacionagricola.com
 01 800 248 8800


cultivos y a las dosis indicadas en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar a RAFIK con agroquímicos de fuerte reacción alcalina ni con productos que pudieran contener. Permanganato de Potasio. En caso que requiera mezclarlo con otro herbicida, realice pruebas a baja escala antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fitotóxicos. Cuando se quieran hacer mezclas, éstas sólo se podrán hacer con productos que tengan registro vigente otorgado por la Autoridad competente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE LA RESISTENCIA: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETA LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

