

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

LIGERAMENTE TOXICO

METODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO: Abra el envase, verifique que el sello de seguridad no esté alterado y proceda a quitarlo, disuelva BIOFRUT* en agua a las dosis indicadas (procurando que el pH del agua sea de reacción neutra a ligeramente ácido, pH 6-7), añada un coadyuvante y siga mezclando.

METODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO:

Variedades sin semilla: BIOFRUT* se aplica por aspersión en suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento de frutos y follaje, esto es de 1,500-2,000 litros por hectárea para aplicaciones terrestres, para mejores resultados úsese equipos de alto volumen (manual o tractor).

Variedades con semilla: BIOFRUT* se aplica en suficiente cantidad de agua esto es de 600-800 litros por hectárea, dirigido a los racimos o haciendo inmersión de éstos en la solución.

CONTRAINDICACIONES: Evite aplicar con amenaza de lluvia.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar BIOFRUT* con productos de reacción altamente alcalina.

EN CASO DE INTOXICACION,
LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO
Y MUESTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel, para evitar la irritación lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón.

Si el producto cayó en los ojos, lavarse con abundante agua durante por lo menos 15 minutos, los síntomas y signos de intoxicación que podrían presentarse son ligeras reacciones alérgicas, el tratamiento recomendado es sintomático y de sostén.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: Evite la contaminación de suelos y fuentes de agua, ya sea por contaminación directa, lavado de equipo o eliminación de sobrantes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacenarlo en lugares frescos a temperaturas menores de 40°C. Manténgase en su envase original bien etiquetado y cerrado. No se almacene ni transporte cerca de alimentos y medicinas.

GARANTIA: Grupo Bioquímico Mexicano S.A. de C.V. y el vendedor limitan su responsabilidad a la reposición del producto defectuoso. Ni el fabricante ni el vendedor, se responsabilizan por daño o pérdida que directa o indirectamente pueda ocasionarle por el mal uso del producto, ya que la aplicación del mismo está fuera de su control. Cualquier otra garantía expresa o implícita que no sea otorgada en forma escrita por el fabricante será automáticamente desechada.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Dosis g/ha	Epoca de aplicación
Manzano: Golden Red Delicious	100 a 150	Para amarre de flor y uniformidad en el tamaño de los frutos aplicar en la caída de los pétalos.
Vid: Cultivares Flame Perlette Thompson Seedless Red Globe Superior	500 a 600 30 a 40	Para tamaño y uniformidad de color, efectuar de 3 ó 4 aplicaciones. La primera cuando la mayoría de los racimos tengan bayas entre 4 a 5 mm de diámetro (primera de tamaño); las siguientes aplicaciones con intervalos de 3 a 5 días. Estas aplicaciones son en aspersión total al follaje. Para tamaño y uniformidad de color, efectuar de 2 a 3 aplicaciones; en Superior, la primera con racimos que tengan bayas entre 7 a 10 mm de diámetro y en Red Globe con bayas entre 12 a 14 mm; las siguientes, con intervalos de 3 a 5 días, en aplicaciones dirigidas al racimo.

Arysta LifeScience Mexico, s.a. de c.v.

Blvd. Jesús Valdés Sánchez Núm. 2369 - 25290 Saltillo, Coahuila, México - Tel.: (844) 438-0500 - Fax: (844) 438-0506

Arysta LifeScience: www.arystalifescience.com - GBM: www.gbm.com