

Everest 70 wdg

Herbicida selectivo a trigo

Gránulos dispersables

Producto registrado

COMPOSICION PORCENTUAL: Porcentaje
en peso

Ingrediente activo:

Flucarbazone-sodio: 4,5-dihidro-3-
metoxy-4-metil-5-oxo-N-
[[2-(trifluorometoxi) fenil] sulfonil]-
1 H-1,2,4-triazole-1-carboxamide,
sal de sodio

No menos de: 70.0%

(Equivalente a 700 g de I.A./kg)

Ingredientes inertes:

Portador, agente de adherencia,
dispersante, lubricante, desintegrante

No más de: 30.0%

Total: 100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente la etiqueta. No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto. Evite inhalar el polvo o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. No permita que durante la aplicación, la aspersión caiga sobre la piel. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales o careta, guantes resistentes a productos químicos, overol, gorra y botas de hule. Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y llame a un médico inmediatamente. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o con una solución alcalina. Después de la jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.

Advertencias sobre riesgos: Este producto es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitarse su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar en casa habitación.

No deberán exponerse ni manejar el producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años.

No se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

LIGERAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

RECOMENDACIONES: Aplicarlo en postemergencia al cultivo cuando éste tenga un mínimo de 1 hoja y hasta 4 hojas en su tallo principal y 2 macollos y a la maleza en etapa temprana de 2 a 4 hojas.

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS

Cultivo	Nombre común	Nombre científico	Dosis g/ha
Trigo*	Avena loca	<i>Avena fava L</i>	20-30
	Alpistillo silvestre	<i>Phalaris minor</i>	30-45

Tiempo de reentrada: 12 horas.

METODO PARA PREPARAR EL PRODUCTO: Las aspersiones pueden efectuarse con cualquier equipo de aplicación terrestre. Utilice un mínimo de 200 L de agua por hectárea en aplicaciones terrestres. Siempre agregue a la dosis recomendada de EVEREST 70 WDG y mezcle hasta que los gránulos se diluyan por completo.

Agregue agua a la mitad de la capacidad total del tanque de aspersión, vierta la premezcla del producto y comience la agitación, continúe llenando con agua hasta su límite.

Continúe con la agitación durante la operación.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar cuando existe posibilidad de lluvia dentro de las cuatro horas siguientes a la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD: Este producto no ha presentado problemas de incompatibilidad cuando se mezcla con agroquímicos autorizados para su uso en el cultivo de trigo. Sin embargo, es recomendable realizar una premezcla para asegurarse de la compatibilidad física de los productos.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico en el cultivo de trigo y a las dosis aquí recomendadas.

EN CASO DE INTOXICACION,
LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO
Y MUESTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto. Consiga atención médica inmediata, y muéstrele la etiqueta al médico. Mantenga al paciente abrigado y en reposo.

Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpio. Si hubo derrame sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Si la persona está inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MEDICO. Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

Al servicio de información toxicológica (SINTOX); para el área metropolitana al (55) 5598-6659 y 5611-2634 las 24 horas.

Grupo químico: Sulfanamida.

Signos y síntomas de intoxicación: Puede provocar náuseas, vómito, temblor de las extremidades y de cuerpo, secreción abundante de saliva, espasmos y dificultad respiratoria, puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles.

Tratamiento y antídoto: No existe antídoto específico. En caso de intoxicación, el tratamiento es sintomático.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: Proteja la vida silvestre. Durante el manejo del producto no contamine el aire, suelo, ríos, lagos, presas o depósitos de agua. En caso de derrames (usar equipo de protección personal) recupere el material en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final. Maneje el envase vacío y su residuos conforme lo establecido en el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No se almacene no transporte junto a productos alimenticios, ropa, forrajes y semillas.

Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.

Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, a la sombra y protegido de la intemperie.

Almacénese a menos de 35°C.

GARANTIA: Sin perjuicio de lo que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor, Arysta LifeScience México garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en la etiqueta en su envase original y sellado y no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo del producto, por ser operaciones fuera de su control.

El comprador asume la responsabilidad y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

Arysta LifeScience Mexico, s.a. de c.v.

Blvd. Jesús Valdés Sánchez Núm. 2369 - 25290 Saltillo, Coahuila, México - Tel.: (844) 438-0500 - Fax: (844) 438-0506

Arysta LifeScience: www.arystalifescience.com - GBM: www.gbm.com