

Pastar*

Herbicida agrícola

Concentrado soluble

Producto registrado

COMPOSICION PORCENTUAL: Porcentaje
en peso

Ingredientes activos:

Aminopyralid: sal triisopropanolamina del ácido 4-amino-3,6-

Dicloropiridina-2-ácido carboxílico (con un contenido no menor de
51.98% de ácido aminopyralid)

No menos de: 6.58%

(Equivalente a 40 g de I.A./L)

2,4-D sal triisopropanolamina del
ácido 2,4-D- diclorofenoxiacético

(con un contenido no menor de
53.61% de ácido 2,4-D)

No menos de: 51.06%

(Equivalente a 320 g de I.A./L)

Ingredientes inertes:

Surfactante, secuestrante y diluyente

No más de: 42.36%

Total: 100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado: mascarilla, guantes de hule, overol, impermeable, lentes protectores, botas de hule y gorra. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y las aplicaciones. No destape las boquillas con la boca. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. Lave con agua y jabón su ropa protectora contaminada antes de volver a usarla.

Advertencia sobre riesgos: PASTAR* es un producto moderadamente tóxico para humanos y animales domésticos. Puede provocar irritación severa, por lo que se deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casas habitación. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años. No se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MODERADAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

INFORMACION GENERAL: PASTAR* es un herbicida selectivo y sistémico recomendado para el control de maleza que se indica a continuación en potreros y pastizales.

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS POTREROS Y MALEZA AQUI RECOMENDADOS

Maleza que controla: Hediondilla (*Senna obtusifolia*), berenjena (*Solanum jazminoide*), malva colorada (*Melochia nodiflora*), zarza de laguna (*Mimosa pigra*), zarza (*Mimosa albida*), huizache (*Acacia farnesiana*), vergonzosa (*Mimosa pudica*), cornezuelo (*Acacia cornigera*), berenjena (*Solanum diversifolium*), tronadora (*Wissadula amplissima*), malva peluda (*Malachra alceifolia*), escobilla (*Sida acuta*), pata de picho (*Senna sp.*), Malva de cochino (*Sida rhombifolia*), Múchil (*Pithecellobium dulce*), Bejuco (*Ipomoea tillacea*).

DOSIS: 1.0 L de PASTAR* en 100 L de agua.

RECOMENDACION: Aplicar en pastos establecidos, preferentemente cuando la maleza tenga de 10 a 40 cm de altura y se encuentre en pleno crecimiento. Evite el pastoreo en las áreas tratadas por lo menos 7 días después de la aplicación.

Los mejores resultados se obtienen en época de lluvia cuando la maleza se encuentra en crecimiento activo y con abundante follaje. No aplique PASTAR* bajo condiciones de sequía, abundante floración o en terrenos inundados.

Se recomienda evitar el pastoreo posterior a su aplicación por tres a cuatro semanas para permitir la recuperación del potrero.

Periodo de reentrada al área tratada: 24 horas.

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR PASTAR*: Ponga la mitad de agua al tanque del equipo de aplicación, agregue la dosis recomendada de PASTAR* y posteriormente complete el llenado, haciendo una pequeña agitación.

PASTAR* puede ser aplicado con equipos manuales y de tractor, dependiendo de la cantidad de maleza presente en el potrero.

Asegúrese de hacer una buena calibración de su equipo para aplicar la dosis correcta, así como de mojar completamente la maleza.

Se recomienda preparar la mezcla que se aplicará diariamente, procurando no dejarla de un día para otro.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DE PASTAR*: La mezcla una vez preparada deberá asperjarse sobre la maleza procurando una buena cobertura de la misma, pero sin llegar al escurrimiento de la mezcla al suelo, que resultaría en pérdidas de producto. El equipo de aplicación debe ser calibrado para obtener el volumen total deseado por hectárea y la dosis aplicada sea correcta.

CONTRAINDICACIONES: al asperjar sobre la maleza en potreros se debe procurar una buena cobertura, pero no deberá escurrir al suelo el producto, ya que excesos de dosis pueden decolorar las hojas del pasto establecido.

INCOMPATIBILIDAD: Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos de la etiqueta.

FITOTOXICIDAD: PASTAR* es fitotóxico a todos los vegetales de hoja ancha por lo que se debe de evitar que entre en contacto con cultivos y plantas deseables susceptibles al ingrediente activo del PASTAR*.

EN CASO DE INTOXICACION,
LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO
Y MUESTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame a los siguientes teléfonos de emergencia del sistema de Información Toxicológica (SINTOX) de la AMIFAC para asistencia médica las 24 horas: sin costo al 01 (800) 009-2800 ó 01 (55) 5598-6659 y 5611-2634, mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios:

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si ha habido contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón. Si ha habido contacto con los ojos, lávese con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: Este herbicida es derivado del ácido picolínico y los fenóxidos.

Ojos: Puede causar irritación severa y daño ligero transitorio a la córnea. Consulte a un oftalmólogo.

Respiración: No debería ocurrir efecto alguno. Si la respiración es difícil, el oxígeno debe ser administrado por personal calificado y bajo supervisión médica.

Ingestión oral: Ligeramente tóxico por vía oral. No inducir el vómito; trasladar el paciente a un hospital.

Piel: Es irritante a la piel.

Antídoto: No hay antídoto específico.

Tratamiento sintomático: No existe antídoto específico por lo que el tratamiento depende del criterio profesional del médico y de la manera como reaccione el paciente.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. Evite la contaminación de fuentes de agua, en caso de derrames absorber el producto derramado con inertes en polvo, aserrín u otro material absorbente. Dejar el tiempo suficiente para asegurar la total absorción, coleccionar los desechos en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final. Aplique el procedimiento de triple lavado del envase vacío y deposite el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde preparó la mezcla (salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide). Con la finalidad de disminuir el

impacto de los envases vacíos al medio ambiente éstos serán confinados y enviados a centros de confinamiento para su destrucción. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Transpórtese y almacénese en un lugar seguro, ventilado, seco y alejado del calor o fuego directo. Guárdese bajo llave, en su recipiente original bien cerrado.

GARANTIA: Dow AgroSciences de México S.A. de C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a Dow AgroSciences de México S.A. de C.V., ésta reembolsaría en importe pagado por el producto. Por ningún motivo Dow AgroSciences de México S.A. de C.V. asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

Dow AgroSciences de Mexico, S.A. de C.V.

Av. Vallarta Núm. 6503, Pisos 7 y 8 - Concentro, Torre Corey - 45010 Guadalajara, Jal., México

Tel.: (33) 3678-2400 - Fax: (33) 3678-2405 - dowagro.com/mx