

Select\* ultra

Herbicida graminicida sistémico  
para hojas anchas

Concentrado emulsionable

Producto registrado

COMPOSICION PORCENTUAL: Porcentaje  
en peso

**Ingrediente activo:**

Clethodim-(E,E) -(+-) -2-[1-[[3-cloro-2-propenil) oxi] Imino] propil]-5-[2-(etiltio) propil]-3-hidroxi -2-ciclohexen-1-ona

No menos de: 12.5%

(Equivalente a 118 g de I.A./L)

**Ingredientes inertes:**

Solvente y emulsificantes

No más de: 87.5%

Total: 100.00%

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Use equipo de protección al aplicar el producto (overol, goggles, guantes de neopreno). No aspirar el líquido ni la aspersión. Quítese de inmediato la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

Lávese por dentro guantes y anteojos.

No coma, beba o fume durante las aplicaciones, ni antes de lavarse las manos y la cara con agua y jabón.

**Advertencia sobre riesgos:**

Este producto puede dañar ojos, piel y membranas mucosas.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar en casas habitación. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años.

No se reutilice el envase, destrúyase.

## **ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

LIGERAMENTE TOXICO

### **INSTRUCCIONES DE USO:**

#### **Siempre calibre el equipo de aplicación**

**INFORMACION GENERAL:** SELECT ULTRA es un herbicida postemergente, sistémico para el control selectivo de las malezas que se indican, únicamente para los cultivos aquí autorizados.

#### **Control de gramíneas aquí indicadas:**

**Dosis:** Siempre aplique de 1.5 litros de SELECT ULTRA en no más de 250 litros de agua/ha, dependiendo del área donde se encuentre.

Se puede aplicar también en áreas agrícolas en periodo de descanso antes de la siembra del siguiente cultivo o bien en áreas que van a permanecer sin cultivo durante el ciclo agrícola. Aplique siempre con una humedad adecuada en el suelo.

Las aplicaciones en condiciones de sequía o bajas temperaturas pueden dar un pobre control.

No aplique SELECT ULTRA inmediatamente antes de una lluvia, porque puede reducirse su efectividad.

#### **Control de gramíneas perennes aquí indicadas:**

**Dosis:** 1.0 litros de SELECT ULTRA en no más de 250 litros de agua/ha.

Se puede aplicar también en áreas agrícolas en periodo de descanso antes de la siembra del siguiente cultivo o bien en áreas que van a permanecer sin cultivo durante el ciclo agrícola.

**Intervalo de seguridad:** No aplique este producto dentro de los 14 días previos a la cosecha.

**Modo de acción:** SELECT ULTRA se absorbe rápidamente por las hojas de la maleza, translocándose a los rizomas; después del tratamiento, la maleza detiene su crecimiento y cambia su coloración.

**METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Determínese la cantidad requerida de producto y viértase al tanque de la aspersora con el sistema de agitación trabajando. No aplique en condiciones de sequía extrema. Aplique temprano para evitar arrastres.

**CONTRAINDICACIONES:** No se aplique cuando amenaza caer lluvias ni con vientos mayores de 8 km/hora ni en cultivos para los cuales no está autorizado su uso.

**INCOMPATIBILIDAD:** No se mezcle con otros productos. Si se realizan mezclas, éstas sólo deberán hacerse con productos registrados en los cultivos aquí autorizados.

**FITOTOXICIDAD:** Aplicando el producto a las dosis aquí recomendadas, no es fitotóxico.

EN CASO DE INTOXICACION,  
LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO  
Y MUESTRELE LA ETIQUETA

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito. Si hay contacto con los ojos o la piel, lávese con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto del líquido con la piel u ojos, lávense de inmediato las salpicaduras con agua limpia. Lávense las manos y las partes expuestas al producto antes de comer o fumar y después del trabajo.

**RECOMENDACIONES AL MEDICO:** SELECT ULTRA pertenece a la clase de las ciclohexanodionas.

**Síntomas y efecto de intoxicación:** Salivación, actividad motora disminuida, hiperreactividad, convulsiones, lagrimación, diarrea, descarga nasal roja y descarga blanca o roja.

**Medidas para confirmar el diagnóstico:** El diagnóstico sólo puede confirmarse con un análisis de muestras de acuerdo a la metodología analítica de muestras.

**Antídoto y tratamiento:** Se recomienda el tratamiento sintomático, no hay antídoto específico.

Llame al servicio de información toxicológica (SINTOX) para el área metropolitana al (55) 5598-6659 y 5611-2634, del interior de la República lada sin costo al 01-800-0092-800.

**MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:** No se utilice el envase vacío; destrúyase. No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, o estanques, evítese lavar el envase o verter el plaguicida en ellos. No alimentar ganado con forraje tratado con este producto.

Este producto es tóxico a peces, aves, crustáceos, animales silvestres y a las abejas. En caso de derrame, aplique inertes absorbentes húmedos como polvo o aserrín sobre el producto derramado; deje que se absorba completamente, deposítelo en envases cerrados. Disponga de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

**CONDICIONES DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE:** Transportar y almacenar en lugar seguro, fresco y seco retirado de alimentos, ropa y forrajes. En caso de derrames esparza aserrín, tierra o arena sobre el producto derramado colecte el material absorbente contaminado y deposítelo en un lugar seguro.

**GARANTIA:** Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, Arysta LifeScience México garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta, las cuales han sido verificadas a través de pruebas de laboratorio, siendo el producto apto para los fines aquí recomendados, esto siempre que el producto sea adquirido en su envase original y protegido por el sello de garantía. Arysta LifeScience México no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo o aplicación inadecuada, así como la interpretación errónea de las instrucciones de uso, por estar fuera de su control y no otorga ninguna otra garantía explícita o implícita.

**USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZA AQUI RECOMENDADOS**

Cultivo	Maleza	Dosis	Observaciones
Algodonero	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	0.5-1.0 L/ha	Aplíquese en forma de lluvia en no más de 25°C
Soya	Zacate bermuda ( <i>Cynodon dactylon</i> ) Zacate de agua ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Zacate pata de gallo ( <i>Eleusine indica</i> )	1.0 L/ha	Aplíquese en forma de lluvia Use no más de 25°C
Alfalfa	Zacate gramma ( <i>Cynodon dactylon</i> )	1.0-2.0 L/ha	Aplíquese en forma de lluvia Use no más de 25°C
Jitomate Tomate de cáscara Papa Berenjena Chile Tabaco	Zacate de agua ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Zacate liendrilla ( <i>Leptochloa filiformis</i> ) Sorgo voluntario ( <i>Sorghum vulgare</i> )	1.0-1.5 L/ha	Aplíquese en forma de lluvia Use no más de 25°C
Frijol	Zacate de agua ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Zacate cola de zorra ( <i>Setaria verticillata</i> ) Cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> )	2.0 L/ha	Aplíquese en forma de lluvia Use no más de 25°C
Cacahuete	Zacate gramma ( <i>Cynodon dactylon</i> )	1.0-1.5 L/ha	Aplíquese en forma de lluvia
Pepino, Calabaza, Calabacita, Sandía, Melón	Zacate kikuyo ( <i>Penisetum clandestinum</i> ) Zacate de agua ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	1.0-1.5 L/ha	Aplíquese en forma de lluvia
Cebollín	Avena ( <i>Avena fatua</i> ) Trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ) Alpiste ( <i>Phalaris minor</i> ) Zacate de agua ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	0.5 -1.5 L/ha	Aplíquese cuando la maleza sea menor de altura y el suelo sea húmedo Aplíquese en forma de lluvia no más de 300 L/ha
Agave	Zacate ( <i>Brachiaria plantaginea</i> ) Zacate de agua ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Zacate burro ( <i>Paspalum sp</i> )	1.5 L/ha	Aplíquese en forma de lluvia cuando ésta tenga menos de 250 L de agua/há

**Tiempo de reentrada a las áreas tratadas:** 48 horas después de la aplicación.

Arysta LifeScience Mexico, s.a. de c.v.

Blvd. Jesús Valdés Sánchez Núm. 2369 - 25290 Saltillo, Coahuila, México - Tel.: (844) 438-0500 - Fax: (844) 438-0506

Arysta LifeScience: [www.arystalifescience.com](http://www.arystalifescience.com) - GBM: [www.gbm.com](http://www.gbm.com)

