

VENECE 480

Concentrado Emulsionable

INGREDIENTE ACTIVO:

Clorpirifos Etil

REGISTRO:

RSCO-INAC-0115-0270-009-44.65

RIQUEZAS GARANTIZADAS:
CLORPIRIFOS ETIL:
O,O-dietil 0-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato
 (Equivalente a 480 g de i.a./L a 20 °C)

PARA EL CONTROL DE:

Gusano soldado: Spodoptera exigua, Adultos de Psílido Asiático de los cítricos: Diaphorina citri; Ninfas Psílido Asiático de los cítricos: Diaphorina citri, Gusano bellotero: Heliothis virescens; Gusano soldado: Spodoptera exigua; Gusano de algodón: Helicoverpa zea, Gusano soldado: Spodoptera exigua; Gusano trozador: Agrotis spp; Picudo egipcio: Euxoa auxiliaris; Chinche ligus: Hypera brunneipennis, Lygus spp, Gusano soldado: Spodoptera exigua, Gusano soldado: Spodoptera exigua, Minador de la hoja: Liriomyza munda; Gusano del fruto: Heliothis zea; Gusano soldado: Spodoptera exigua, Gusano cogollero: Spodoptera frugiperda; Gusano soldado: Mythimna unipuncta, Pulgón lanígero: Eriosoma lanigerum, Minador de la hoja: Liriomyza munda, Mosquita midge: Contarinia sorghicola; Gusano cogollero: Spodoptera rugiperda; Gusano elotero: Heliothiszea, Gusano soldado: Spodoptera exigua, Mythimna unipuncta; Minador de la hoja: Liriomyza sp, Gusano soldado: Spodoptera exigua, Mythimna unipuncta; Gusano peludo: Estigmene acraea, Gusano cogollero: Spodoptera exigua; Gusano soldado: Mythimna unipuncta.

PRINCIPALES CULTIVOS:

Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Zarzamora, Lima, Limonero, Mandarino, Naranja, Tangerino, Toronjo, Algodón, Alfalfa, Arroz, Chile, Jitomate, Maíz, Manzana, Pepino, Sorgo, Frijol ejotero, Soya, Trigo.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*
Arándano* Frambuesa* Fresa* Grosella* Zarzamora*	Gusano soldado: Spodoptera exigua.	1.25 – 1.50	7
Lima** Limonero** Mandarino** Naranja** Tangerino** Toronjo**	Adultos de Psílido Asiático de los cítricos: Diaphorina citri; Ninfas Psílido Asiático de los cítricos: Diaphorina citri.	1.0 - 2.0 1.5 - 2.0 1.0 -2.0	21
Alfalfa	Gusano soldado: Spodoptera exigua; Gusano trozador: Agrotis spp; Picudo egipcio: Euxoa auxiliaris; Chinche ligus: Hypera brunneipennis, Lygus spp.	0.75 - 1.0 1.5 - 1.75 0.5 - 1.0 1.0 - 1.5	21

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	APLICACIÓN
Arroz	Gusano soldado: Spodoptera exigua	0.75 - 1.25	21
Chile	Gusano soldado: Spodoptera exigua	1.0 - 1.5	7
Jitomate	Minador de la hoja: Liriomyza munda; Gusano del fruto: Heliothis zea; Gusano soldado: Spodoptera exigua.	1.5 - 2.0	1
Maíz	Gusano cogollero: Spodoptera frugiperda; Gusano soldado: Mythimna unipuncta.	0.5 - 0.75 0.75 - 1.5	21
Manzano	Pulgón lanígero: Eriosoma lanigerum.	1 a 2 ml/L de agua	30
Pepino	Minador de la hoja: Liriomyza munda.	1.5 - 2.0	7
Sorgo	Mosquita midge: Contarinia sorghicola; Gusano cogollero: Spodoptera rugiperda; Gusano elotero: Heliothiszea.	0.5	21
Frijol ejotero	Gusano soldado: Spodoptera exigua, Mythimna unipuncta; Minador de la hoja: Liriomyza sp.	1.0 - 1.5	20
Soya	Gusano soldado: Spodoptera exigua, Mythimna unipuncta; Gusano peludo: Estigmene acraea.	1.0 - 1.5	21
Trigo	rGusano cogollero: Spodoptera exigua; Gusano soldado: Mythimna unipuncta.	0.75 - 1.0	21

*Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 530 – 630 L de agua /ha.

**Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 900-1000 L de agua/ha.

***Realizar dos aplicaciones, al follaje, a intervalos de 14 días; volumen de aplicación 600-700 L/ha.

****Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola

innovacionagricola.com
01 800 248 8800



CULTIVO	LMR	FUENTE
Algodonero	0.2	EPA
Alfalfa	3.0	EPA
Chile	0.01	Unidad Europea
Jitomate	0.01	Unidad Europea
Maíz	0.05	EPA
Manzano	0.01	EPA
Pepino	0.05	EPA
Sorgo	0.5	EPA
Frijol ejotero	0.05	Unidad Europea
Soya	0.3	EPA
Trigo	0.5	EPA
Arroz	0.05	Unidad Europea
Cítricos (Lima, limonero, mandarino, naranjo, tangerino, toronjo)	1.0	EPA
Arándano	0.05	Unidad Europea
Frambuesa	0.01	Unidad Europea
Fresa	0.02	Unidad Europea
Grosella	0.01	Unidad Europea
Zarzamora	0.01	Unidad Europea

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto, abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare. Aplíquese en forma de aspersión usando cualquier tipo de equipo terrestre que asegure un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

CONTRAINDICACIONES

No aplique cuando el viento sea muy fuerte (>15 km/hr) ni a temperaturas muy altas (>35 °C).

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas bajo las anteriores Instrucciones de uso.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar con otros productos, aplíquese solo.



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola

innovacionagricola.com
01 800 248 8800

